



FACULTAD DE MEDICINA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

LA PERCEPCIÓN DE UN CUIDADO MÉDICO LIMITADO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 AFECTA LA EXPERIENCIA DE DUELO DE FAMILIARES

Sebastián Soto-Guerrero¹, Pedro Pérez-Cruz¹, Joel Castellano²

¹ Programa Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, Pontificia Universidad Católica De Chile. ² Programa Farmacología y Toxicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

INTRODUCCIÓN

• La pandemia de COVID-19 supuso serios desafíos para garantizar la continuidad de los cuidados de personas en fin de vida.

• Percibir que el cuidado de fin de vida de los pacientes fue limitado durante la pandemia puede traer implicancias en la experiencia de duelo de sus familiares.

OBJETIVOS

• Identificar las características del cuidado de fin de vida que se asocian con una percepción del cuidado médico limitado.

• Identificar los efectos de la percepción de un cuidado médico limitado en la experiencia actual de duelo de los familiares.

MÉTODOS

• Estudio observacional transversal de familiares en proceso de duelo reclutados en un hospital universitario en Santiago de Chile, entrevistados después de los seis meses del fallecimiento. Se consideraron a todos los que ya habían sido reclutados en la encuesta telefónica post-mortem de tres meses.

INSTRUMENTOS

Se obtuvieron datos sociodemográficos del paciente y del familiar e información sobre:

- Características de la atención en salud recibida.
- Percepción sobre limitación del cuidado: ¿Cree que el tratamiento o cuidado de su familiar se vio afectado por la crisis del coronavirus? Sí/No
- Descripción del momento de morir y muerte
- Estado anímico del familiar en la entrevista

RESULTADOS




El 45% del total de familiares entrevistados percibió limitaciones en el cuidado de fin de vida en contexto de la pandemia de COVID-19.

Figura 1. Caracterización demográfica diada (N=155)



RESULTADOS

Se presentan algunas de las asociaciones significativas de mayor interés (p<0.05)



CONCLUSIONES

- La percepción de un cuidado médico limitado por la pandemia de COVID-19 se asocia con peores resultados en la percepción de la calidad de los cuidados de fin de vida.
- Al mismo tiempo, se asocia con una valoración desfavorable del morir y la muerte.
- La percepción de cuidado médico limitado se asocia a mayor malestar psíquico y más dificultades en la elaboración del duelo a seis meses del fallecimiento.

Correspondencia: susoto@uc.cl