

Opioides en el **manejo del dolor** moderado a severo en pacientes con cáncer

NOMOGRAMA EQUIANALGESIA DE OPIOIDES

Tramadol	Codeína	Morfina			Oxicodona	Tapentadol	Buprenorfina	Fentanilo
VO	VO	VO	SC	EV	VO	VO	Transdérmico	Transdérmico
50	60	10	5	3				
100	120	20	10	6	10	50		
150	180	30	15	9		100	17,5	12,5
200	240	40	20	12	20			
250		50	25	15				
300		60	30	18	30	200	35	25
400		80	40	24	40			
		90	45	27				
		100	50	30				
		120	60	36	60	400	70	50
		240	120	72				100

METADONA - MERCADANTE 2001

Morfina oral 24h mg/h	30-90	90-300	>300
Radio conversión Metadona oral	4:1	8:1	12:1

Recomendaciones

- ✓ Usar medicamento para prevenir los efectos adversos más frecuentes (Náuseas y vómitos, somnolencia y constipación).
- ✓ Al rotar opioides hacer reducción del 50% por la tolerancia cruzada incompleta.
- ✓ El uso de metadona o dosis equivalente de morfina diaria > a 200 requieren manejo de expertos.

D. pareja, O. Leiva, Equipo Medicina Paliativa UC. Proyecto FONIS SA18I0039. Julio 2021.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE



Fonis
Fondo Nacional
de Investigación en Salud